



OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

Etapa locală, 27.01.2007

CLASA a XII-a (OM1)

1. Calculați: $\int \frac{x^{6n+2}}{x^{8n+4} + 1} dx, n \in \mathbb{N}.$

G.M. 4/2006

2. Să se determine funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, care admit primitive astfel încât $f(\operatorname{tg} x) + \sin x \cdot F(\operatorname{tg} x) = 0$, pentru orice $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, unde F este o primitivă a lui f .

prof. Doru Constantin Caragea

3. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Se presupune că există $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ primitivă a lui f , cu proprietățile:

a) $F(0) = 1$;

b) $f((a, b)) \cap F((a, b)) \neq \emptyset, \forall a, b \in \mathbb{R}, a < b.$

Arătați că $f(x) = e^x, \forall x \in \mathbb{R}.$

prof. Gabriela Constantinescu

4. Fie (G, \cdot) grup finit cu n elemente, cu proprietatea: $\forall a \in G$, ecuația $x^2 = a$ are soluție în G .

a) Demonstrați că n este impar.

b) Pentru n impar oarecare, dați un exemplu de grup care verifică ipoteza problemei.

Subiectele au fost selectate de profesorii: Doru Constantin Caragea, Gheorghe Andrei, Nelu Chichirim, Cătălin Zîrnă.

NOTĂ

- Timp de lucru 3 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Fiecare subiect se punctează de la 0 la 7. Nu se acordă puncte din oficiu.